



九州シンクロトロン光研究センター 県有ビームライン利用報告書

課題番号：2101001F

BL番号：BL11

(様式第5号)

地下鉄構内および屋外大気におけるエアロゾル中 Fe 元素の XANES による化学状態解析 XANES chemical speciation of Fe in ambient aerosols collected in subway and outdoor environment

奥田知明・三木健司・岡本拓真・齊藤響

Tomoaki OKUDA, Kenji MIKI, Takuma OKAMOTO, Hibiki SAITO

慶應義塾大学理工学部応用化学科

Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology,
Keio University

- ※1 先端創生利用（長期タイプ）課題は、実施課題名の末尾に期を表す（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）を追記してください。
- ※2 利用情報の公開が必要な課題は、本利用報告書とは別に利用年度終了後2年以内に研究成果公開〔論文（査読付）の発表又は研究センターの研究成果公報で公表〕が必要です（トライアル利用を除く）。
- ※3 実験に参加された機関を全てご記載ください。
- ※4 共著者には実験参加者をご記載ください（各実験参加機関より1人以上）。

1. 概要（注：結論を含めて下さい）

屋外で捕集した粒子状物質（エアロゾル粒子）中の金属成分である Fe および Zn の XANES スペクトルを取得した。粒子状物質採取地点の異なる試料を分析した結果、粒子の採取地点により、Zn の XANES スペクトルが異なっていた。このことから、採取地点によって大気粒子中の Zn の化学状態が異なる可能性が示唆された。今後、屋外と地下鉄空气中粒子状物質の物理化学特性や細胞応答性の解明において本法が役立つことが期待される。

(English)

The XANES spectra of Fe and Zn in particulate matter (aerosol particles) collected outdoor were acquired. As a result of analyzing samples with different sampling points, XANES spectra of Zn in outdoor particle are different from each other. This fact suggests that the chemical state of Zn would be different depending on the sampling points. It is expected that this method would be useful for elucidating the physicochemical properties and cellular responses of particulate matter in the outdoor.

2. 背景と目的

近年、PM_{2.5}に代表される空気中の微小粒子状物質の有害性が懸念されている。2009年に定められた我が国のPM_{2.5}（粒径2.5 μm以下の粒子状物質）の環境基準は質量濃度のみが対象であるが、実際の有害性は粒子の物理化学特性に起因すると考えられるため、PM_{2.5}濃度に加えてその化学成分・形態を解明することは喫緊の課題である。大気粒子中に含まれる元素はその化学形態により有害性が異なることが知られており、粒子の有害性を評価する上で、元素の化学形態を明らかにすることは重要である。そこで本研究では、放射光 XAFS を用いて、屋外大気において採取された粒子中の鉄および亜鉛の化学状態を測定し、その差異に伴う物理化学特性や細胞応答性の違いを解明することを目的と

した。

3. 実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）

本研究では、神奈川・埼玉・福岡においてバーチャルインパクトとサイクロンを組み合わせた微小粒子と粗大粒子の大流量同時採取装置²⁻⁵⁾を稼働させ、大気粒子の採取を行った。流量は 1,200 L/min とし、3~4 週間の稼働で約 100~200 mg 程度の粒子状物質を得た。また、中国・インドにおいても同様に PM_{2.5} の採取を行った。この大気粒子試料約 10 mg とセルロースパウダー約 300 mg を 50 kN のプレスにかけ、層状にペレット成型した。これらのペレット試料を SAGA-LS の BL11 に持ち込み、放射光 XAFS の実験を行った。

Fe K 吸収端近傍である 6,781-7,858 eV のエネルギー領域において、7 素子 SDD を用いた蛍光収量法により XAFS 測定を行った。測定パラメータは、XANES 領域のみ 0.36 eV/step (積算 1 s/step) とし、残りの領域は 1.90-6.00 eV/step (1 s/step) とした合計 15 分の系で行った。

また、Zn K 吸収端近傍 9,331~10,210 eV のエネルギー領域において、7 素子 SDD を用いた蛍光収量法により XAFS 測定を行った。測定は、XANES 領域を 0.36 eV/step (4 s/step)、9,721 eV 以降の領域を 1.91~16.76 eV/step (2 s/step) とし、残りの領域は 6.00 eV/step (1 s/step) とした合計約 30 分の系で行った。

4. 実験結果と考察

図 1 に、日本 (神奈川)、インドおよび中国で採取された大気粒子中 Fe の XANES スペクトルの測定結果を示した。図 1 を見ると、インドで採取された微小粒子中 Fe の XANES スペクトルは、日本と中国で採取された微小粒子中 Zn の XANES スペクトルと比較して、7,110 eV 近傍でのピークの立ち上がり異なることや、吸光度のピーク値が約 1.3 とやや低いという違いが見られた。

次に、日本 (神奈川)、インドおよび中国で採取された大気粒子中 Zn の XANES スペクトルの測定結果を図 2 に示した。図 2 を見ると、日本と中国で採取された微小粒子中 Zn の XANES スペクトルの吸光度のピーク値は約 1.5~1.6 であるのに対し、インドで採取された大気粒子中 Zn の XAFS スペクトルの吸光度のピーク値は約 1.2 となっているなど、大きくスペクトル形が異なっていた。

続いて、日本国内の 3 地点 (神奈川、埼玉および福岡) で採取された大気粒子中 Zn の XANES スペクトルの測定結果を図 3 に示した。図 3 を見ると、神奈川と埼玉で採取された微小粒子中 Zn の XANES スペクトルの吸光度のピーク値は約 1.5 であるのに対し、福岡で採取された大気粒子中 Zn の XAFS スペクトルの吸光度のピーク値は約 2.0 となっているなど、大きくスペクトル形が異なっていた。

以上より、屋外大気において、国内外における試料採取地点の違いにより、得られた XANES スペクトルの形が異なることが分かった。このことから、粒子中の Fe および Zn の化学状態が異なる可能性が示唆された。今後は、大気粒子中 Fe および Zn の XANES スペクトルにおいて、Fe および Zn の標準物質の XANES スペクトルを用いて線形合成解析を行うことで、詳細な化学状態の解明を行っていく。




図1. 日本、インドおよび中国で採取された微小粒子中 Fe の XANES スペクトル




図2. 日本、インドおよび中国で採取された微小粒子中 Zn の XANES スペクトル




図3. 神奈川、埼玉および福岡で採取された微小粒子中 Zn の XANES スペクトル

5. 今後の課題

今後は、大気粒子中に存在する Fe と Zn 以外の元素についても XAFS スペクトル解析を行い、採取地点の違いによる粒子状物質のより詳細な物理化学特性の違いの解明を目指す。また、これらの粒子を細胞に曝露することで、粒子が採取された地点の違いによる細胞応答性の違いの解明も目指していく。

6. 参考文献

- 1) 奥田知明, 坂出壮伸, 藤岡謙太郎, 田端凌也, 黒澤景一, 野村優貴, 岩田歩, 藤原基 (2019) 地下鉄構内空气中粒子状物質の特性調査, 大気環境学会誌, **54** (1), 28-33.
- 2) T. Okuda, R. Isobe, Y. Nagai, S. Okahisa, K. Funato, K. Inoue, “Development of a high-volume PM2.5 particle sampler using impactor and cyclone techniques”, *Aerosol Air Qual. Res.*, **15**, 759-767 (2015).
- 3) K. Ogino, K. Nagaoka, T. Okuda, A. Oka, M. Kubo, E. Eguchi, Y. Fujikura, “PM2.5 induced airway inflammation and hyperresponsiveness in NC/Nga mice”, *Environ. Toxicol.*, **32**, 1047-1054 (2017).
- 4) T. Okuda, R. Isobe, “Improvement of a high-volume aerosol particle sampler for collecting submicron particles through the combined use of a cyclone with a smoothed inner wall and a circular cone attachment”, *Asian J. Atmos. Environ.*, **11**, 131-137 (2017).
- 5) T. Okuda, D. Shishido, Y. Terui, K. Fujioka, R. Isobe, Y. Iwaki, K. Funato, K. Inoue, “Development of a high-volume simultaneous sampler for fine and coarse particles using virtual impactor and cyclone techniques”, *Asian J. Atmos. Environ.*, **12**, 78-86 (2018).

7. 論文発表・特許 (注: 本課題に関連するこれまでの代表的な成果)

齋藤克知, 奥田知明, 長谷川就一, 西田千春, 原圭一郎, 林政彦, サイクロン法で採取された粒子状物質中 Cr の XAFS による化学状態解析, 大気環境学会誌, **55** (2), 27-33, doi:10.11298/taiki.55.27

8. キーワード (注: 試料及び実験方法を特定する用語を 2~3)

PM_{2.5}、XANES、Zn

9. 研究成果公開について (注: ※2に記載した研究成果の公開について①と②のうち該当しない方を消してください。また、論文(査読付)発表と研究センターへの報告、または研究成果公報への原稿提出時期を記入してください(2019年度実施課題は2021年度末が期限となります)。
長期タイプ課題は、ご利用の最終期の利用報告書にご記入ください。

① 論文(査読付)発表の報告

(報告時期: 2023年 3月)